

シアリス錠 5mg シアリス錠 10mg シアリス錠 20mg

【この薬は？】

販売名	シアリス錠 5mg Cialis Tablets 5mg	シアリス錠 10mg Cialis Tablets 10mg	シアリス錠 20mg Cialis Tablets 20mg
一般名	タダラフィル Tadalafil		
含有量 (1錠中)	5mg	10mg	20mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、「医薬品医療機器情報提供ホームページ」
<http://www.info.pmda.go.jp/> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、ぼっ起不全治療剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、陰茎海綿体平滑筋を弛緩させ、海綿体洞への血液量を増加させることによって、陰茎をぼっ起、維持させます。
- ・次の病気の人に処方されます。
勃起不全（満足な性行為を行うに十分な勃起とその維持が出来ない患者）
- ・この薬は、ぼっ起不全や他の病気を診断するために過去にかかった病気の調査や検査を行い、治療が必要と判断された人に限り、医師の判断により処方されます。
- ・この薬には、性行為感染症を防ぐ効果はありません。
- ・この薬は、自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると本来の効果

が得られないことがあります。指示どおりに飲むことが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

この薬とニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビドなどの硝酸剤等を併用した場合、過度に血圧が低下することがあります。

死亡例を含む心筋梗塞などの重篤な副作用が報告されています。

患者および家族の方は、【この薬を使う前に、確認すべきことは？】、【この薬の使い方は？】および【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】に書かれていることに特に注意してください。

また、医師から渡される「パンフレット」も参照してください。

次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にシアリス錠に含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人
- ・ニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビドなどの硝酸剤等を使用している人
- ・心臓に障害があるなど性行為が不适当と考えられる人
- ・不安定狭心症の人または性交中に狭心症をおこしたことがある人
- ・安定していない不整脈の人、低血圧の人または安定していない高血圧の人
- ・最近3カ月以内に心筋梗塞をおこしたことがある人
- ・最近6カ月以内に脳梗塞・脳出血をおこしたことがある人
- ・肝臓に重い障害がある人
- ・網膜色素変性症の人

次の人は、慎重に使う必要があります。使用する前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・陰茎の構造に欠陥（屈曲、陰茎の線維化、ペイロニー病など）がある人
- ・血液の病気（鎌状赤血球性貧血、多発性骨髄腫、白血病など）がある人
- ・他のぼっ起不全治療薬を使用している人
- ・出血性疾患、または消化性潰瘍がある人
- ・高齢（65歳以上）の人

この薬には併用してはいけない薬[硝酸剤およびNO供与剤（ニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド等）]や併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

使用量および回数

あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

販売名	シアリス錠 5mg	シアリス錠 10mg	シアリス錠 20mg
一回量	2錠	1錠	
飲む回数	1日1回		

器質性または混合型ぼっ起不全の人で、10mgを飲んでも十分な効果が得られず、忍容性が良好（副作用があらわれているとしても、十分耐えられる程度で、シアリス錠による治療の継続が可能）と判断され

た場合には、20mgを飲むように指示されることがあります。

- ・ この薬は性行為の約1時間前に飲みます。
- ・ 肝臓に軽い障害または中等度の障害がある人は、1回に10mgを超えて飲まないでください。
- ・ 腎臓に中等度の障害がある人が、初めて飲む場合は、1回に5mgから開始されます。なお、1回に10mgを超えて飲まないでください。また、腎臓に重い障害がある人は、1回に5mgを超えて飲まないでください。
- ・ 次に飲むまで24時間以上あけてください。ただし、腎臓に中等度の障害がある人が1回に10mgを飲む場合は、次に飲むまで48時間以上あけてください。
- ・ ケトコナゾール、イトラコナゾール、クラリスロマイシンなどを使用している人が初めて飲む場合は、1回に5mgから開始されます。1回に10mgを超えて飲まないでください。1回に10mgを飲む場合は次に飲むまで48時間以上あけてください。

どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

多く使用した時（過量使用時）の対応

副作用（頭痛、背部痛、消化不良、潮紅、筋痛など）があらわれる可能性があります。いくつかの症状が同じような時期にあらわれた場合は、医師または薬剤師に連絡してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・ ぼっ起が4時間以上続く可能性があり、6時間以上ぼっ起が続いた場合、処置が遅れるとぼっ起機能が失われることがあります。ぼっ起が4時間以上続いたら、ただちに医師を受診してください。
- ・ この薬は、催いん剤または性欲増進剤ではありません。
- ・ めまいや視覚障害（眼のかすみなど）があらわれることがあります。高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する場合には注意してください。
- ・ グレープフルーツジュースはこの薬に影響しますので、控えてください。
- ・ 他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください

副作用は？

特にご注意ください重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。

このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
過敏症 かびんしょう	〔発疹としてあらわれる場合〕 発疹、吹出もの
	〔蕁麻疹（じんましん）としてあらわれる場合〕 かゆみのある虫さされのような発疹

	<p>〔顔面浮腫としてあらわれる場合〕 眼がはれぼったい、顔がはれぼったい、顔のむくみ</p> <p>〔剥脱性皮膚炎（はくだつせいひふえん）としてあらわれる場合〕 全身の発赤、皮膚の表面がはがれる、かゆみ、発熱</p> <p>〔Stevens-Johnson 症候群（スティーブンスージョンソンしょうこうぐん）としてあらわれる場合〕 陰部の痛み、食欲不振、中央にむくみをともなった赤い斑点、からだがだるい、ひどい口内炎、唇や口内・結膜のただれ、まぶたや眼の充血、発熱、赤い発疹</p>
--	--

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	発熱、からだがだるい
顔面	顔がはれぼったい、顔のむくみ
眼	眼がはれぼったい、結膜のただれ、まぶたや眼の充血
口や喉	唇や口内のただれ、ひどい口内炎
腹部	食欲不振
皮膚	発疹、吹出もの、かゆみのある虫さされのような発疹、全身の発赤、皮膚の表面がはがれる、かゆみ、中央にむくみをともなった赤い斑点、赤い発疹
その他	陰部の痛み

【この薬の形は？】

販売名	シアリス錠 5mg	シアリス錠 10mg	シアリス錠 20mg
形状	アーモンド形の錠剤 	アーモンド形の錠剤 	アーモンド形の錠剤 
直径	長径 9.7mm 短径 6.0mm	長径 11.0mm 短径 6.8mm	長径 12.3mm 短径 7.6mm
厚さ	4.0mm	4.5mm	5.0mm
重さ	180mg	260mg	360mg
色	くすんだ黄色	くすんだ黄色	くすんだ黄色
識別コード	<i>C5</i>	<i>C10</i>	<i>C20</i>

【この薬に含まれているのは？】

販売名	シアリス 5mg	シアリス 10mg	シアリス 20mg
有効成分	タダラフィル		
添加物	乳糖水和物、結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ラウリル硫酸ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、黄色三二酸化鉄、トリアセチン、タルク		

【その他】

この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売元：日本イーライリリー株式会社

発売元：日本新薬株式会社（<http://www.nippon-shinyaku.co.jp/>）

くすり相談窓口

電話：075-321-9064

受付時間：9時～17時30分

（土、日、祝日、その他当社の休業日を除く）